

*3. Erysimum diffusum* Ehrh.

## Horčičník konáristý

Ic.: Tab. 21, fig. 1, 2, p. 193

*Erysimum diffusum* Ehrh. Beitr. Naturk. 7, p. 157, 1792.Syn.: *Erysimum canescens* Roth 1797.

Dvojročná bylina. Koreň drevnatujúci, ca 10 cm dlhý, belavý až sivohnedý; koreňová hlava 2–4 cm široká. Byl jednotlivá alebo viacbyľové typy, jednoduchá, rozkonárená, (niekedy v dolnej časti s adventívnymi listovými ružicami), slabo až osto 4-hranná, na hranách jemne ryhovaná, 18–120 cm vysoká, trávovozelená až sivozelená, v dolnej časti takmer holá alebo pritisnuto roztrúsene chlpatá až chlpatá (chlpy prevažne vidlicovité), smerom k vrcholu riedko až roztrúsene chlpatá. Listy ružice a v dolnej polovici biele stopkaté, v hornej sediace; všetky listy na báze pretiahnuté, na vrchole končisté, na okraji takmer celistvookrajové až riedko a slabo zúbkaté, na líci riedko až roztrúsene pritisnuto chlpaté alebo husto chlpaté (chlpy len vidlicovité), na rubu odstávajúco chlpaté až husto chlpaté (chlpy len vidlicovité). Vreteno súkvetia husto chlpaté. Kališné lístky na okraji s blanitým lemom, zelenkasté s tmavozelenými žilkami, na vonkajšej strane husto pritisnuto chlpaté (chlpy najmä vidlicovité, ale aj 3-ramenné), na vnútornnej holé. Korunné lupienky do 5 mm široké, bledosirovožlté. Tyčinky 0,6–1 cm dlhé; nitky aj peňnice holé. Čnelka 6–9 mm dlhá, belavá až medovohnedá; blizna guľovitá až bochníkovitá. Stopky plodov a chlopne šešúľ pokryté len vidlicovitými chlpmi; čnelka na plode prevažne s 3-ramennými chlpmi. Semená ca 0,6–1,3 mm široké.

V rámci druhu boli na Slovensku zistené 3 cytotypy, ktoré sa líšia nasledujúcimi morfológickými znakmi:

1. Diploidný cytotyp ( $2n = 2x = 14$ ). Listy ružice takmer čiarkovité, blanité; stopka 2–3 cm dlhá; čepel 3–3,5×0,15–0,2 cm veľká; stopka byľových listov v dolnej polovici biele 0,5–0,6 cm dlhá; čepel elipsovítá, 5,5–7,5×0,25–0,3 cm veľká; čepel listov v hornej polovici biele úzko elipsovítá, 4–4,5×0,2–0,25 cm veľká. Stopky kvetov 3,5–4 mm dlhé. Kališné lístky 0,5–0,6×0,1–0,15 mm veľké, žltkastozelené. Korunné lupienky 9–10 mm dlhé; lupene 2,5–4×1,5–2 mm veľké. Šesťule 35–70×0,8 mm veľké; čnelka na plode 0,9–1 mm dlhá; chlopne pritisnuto husto chlpaté, na hranách riedko chlpaté. Stopky plodov šikmo odstávajúce, 6–7 mm dlhé a 0,2 mm hrubé, pritisnuto riedko chlpaté. Semená 0,6–1 mm dlhé, hnedozelené.

2. Tetraploidný cytotyp ( $2n = 4x = 28$ ). Listy ružice úzko kopijovité až kopijovité; stopka 1–2 cm dlhá; čepel 2–3×0,2–0,5 cm veľká; stopka byľových listov v dolnej polovici biele 0,8–0,9 cm dlhá; čepel obrátene kopijovitá, 3,5–5×0,15 cm veľká; čepel listov v hornej polovici biele úzko obrátene kopijovitá, 3,2–3,5×0,1–0,15 cm veľká. Stopky kvetov 2–3,5 mm dlhé. Kališné lístky 0,6–0,65×